

VAKCINAČNÍ KARTA

- Zahájení vakcinace **14 dní před nebo 14 dní po provedení splenektomie**
- V případě probíhající onkologické léčby nebo imunosuprese vakcinace 14 dní před jejím zahájením nebo 3 měsíce po jejím skončení

Vakcinace: MENINGOKOK

- **4 - valentní konjugovaná vakcína proti meningokoku ACWY (MenACWY)**
 - 2. dávka 8-12 týdnů po 1. dávce
 - Booster á 5 let od 2. dávky
- **Monovalentní rekombinantní vakcína proti meningokoku B (MenB 4C)**
 - 2. dávka 8-12 týdnů po 1. dávce

MenB 4C

| Datum | Vakcína | Podal |
|-------|---------|-------|
| | | |
| | | |

MenACWY

| Datum | Vakcína | Podal |
|-------|---------|-------|
| | | |
| | | |

MenACWY – Booster á 5 let

| Datum | Vakcína | Podal |
|-------|---------|-------|
| | | |
| | | |

Vakcinace: HEMOFILUS TYPU B

- **Monovalentní konjugovaná vakcína proti hemofilu typu B (ACT – HiB)**
 - pouze 1 dávka bez booster dávek

ACT - HiB

| Datum | Vakcína | Podal |
|-------|---------|-------|
| | | |
| | | |

Vakcinace: PNEUMOKOK

- **13 – valentní konjugovaná pneumokoková vakcína (PCV13)**
 - 1 dávka
- **23 – valentní polysacharidová pneumokoková vakcína (PPSV23)**
 - * V ČR od 10/2017 dostupná na speciální dovoz (Pneumovax 23)
 - 1. dávka 8-12 týdnů po PCV13
 - Následně 2x booster:
 1. 5 let po podání 1. dávky
 2. v 65 letech věku
- **Pacienti nad 65 let: PCV13 a 1x PPSV23**

PCV13

| Datum | Vakcína | Podal |
|-------|---------|-------|
| | | |
| | | |

PPSV23

| Datum | Vakcína | Podal |
|-------|---------|-------|
| | | |
| | | |

Vakcinace: CHŘIPKA

- **Inaktivovaný, štěpený virion (Vaxigrip)**
- Každoroční, ideálně v říjnu (na podzim)
- Celoživotní cestou praktického lékaře

VAXIGRIP

| Datum | Vakcína | Podal |
|-------|---------|-------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

ATB PROFYLAXE

| Indikace | Délka profylaxe |
|----------------------------|---|
| Současná onkologická léčba | Zahájení v den splenektomie a ukončení po vakcinaci |
| Současná imunosuprese | Zahájení v den splenektomie a ukončení po skončení imunosuprese |

| | | |
|-----------------------|-----|----|
| Profylaxe indikována: | Ano | Ne |
|-----------------------|-----|----|

| | |
|---------------|--|
| Profylaxe od: | |
|---------------|--|

| | |
|---------------|--|
| Profylaxe do: | |
|---------------|--|

| | |
|------|----------------------------------|
| ATB: | V – Penicilin 500mg á 12h |
|------|----------------------------------|

| | |
|--------------|---|
| Při alergii: | Biseptol 960mg á 24h nebo Klacid 500mg á 24h |
|--------------|---|

ATB profylaxe

| Název | Denní dávka | Nasadil |
|-------|-------------|---------|
| | | |
| | | |